

Много свиней существует на планете, но здесь мы напишем о самой редкой и малоизученной. Это яванская свинья. Этот вид внесен в Красную книгу и относится к тем, которые почти полностью вымерли. В основном они обитают на некоторых Индонезийских островах, к примеру, Филиппины и Сулавеси. Они характеризуются тремя бородавками по обеим сторонам морды,которые расположены под глазами, перед глазами и на заднем углу нижней челюсти. Обитают свиньи преимущественно в кустарниковых долинах рек, высокотравных саваннах и болотах. Интересно, что много исследователей определяют яванских бородавочников в один вид с бородатой свиньей. Эти свиньи обладают очень разнообразной внешностью, поэтому их и делят на одиннадцать подвидов. Длина тела от 90 до 190 см, а масса 44-108 кг. У всех имеется длинная грива, которая спускается вниз по затылку к шее, вдоль позвоночника и до крупа. Предупреждают свиньи об опасности друг друга пронзительным свистом. Этот вид является интересным для наблюдения, ведь яванские свиньи используют разнообразные визуальные сигналы и некоторое тактильное общение. Сильно проявляется оно между матерями и детёнышами. Средняя продолжительность жизни составляет 8 лет. Очень редко, но доживают 14 лет. Шерсть у них красноватого цвета. Ноги, как у модели прям, стройные, хвост длинный, на кончике с небольшим пучком волос. Голова большая, тяжёлая, слегка выпуклая.

Большое количество яванских свиней ведут ночной образ жизни. Как правило, самцы предпочитают держаться в одиночку, лишь только детёныши остаются рядом с матерями. По поводу тревоги уже говорилось, предупреждают животные поднимая гриву на спине и хвост, становятся в прямую или изогнутую позу, а затем свистят. Они полигамные животные, самцы активно конкурируют за право обладать самками. У самок беременность длится 4 месяца. Рождается 3- 9 детёнышей в сезон с января по март. Барышни-свинки достигают половой зрелости в восемь месяцев, однако начинают обзаводится потомством с 1,5 лет.Что касается самцов, так они начинают размножаться с того момента, как способны конкурировать за самок. Вообще в бреднем это с 5 лет. По поводу численности – точных данных не существует. Но, за последние 20 лет, их численность достаточно сократилась. На сегодняшний день существует 10 обитающих

изолирующих групп.