Добавил(а) Administrator
10.03.15 16:35 -



Инфекционные болезни свиней имеют собственные особенности. Причины их появления – болезнетворные микробы, вирусы, микоплазмы и т.д. Они могут передаваться здоровым особям от больных. После того окончания болезни, у животных появляется иммунитет к такому вирусу. Течение инфекционных болезней имеет этапность: инкубационный период, предвестники, разгар, угасание и выздоровление. Среди инфекционных болезней в практике чаще всего можно встретить рожу, чуму, вирусный гастроэнтерит, болезнь Ауэски.

Чума

Эта болезнь очень заразная и опасная для свиней любого возраста. Протекает она в подострой, острой и хронической форме. Возбудитель – вирус. Источник заразы – больные особи, выделения, грязные корма, предметы ухода, вода.

Инфекцию также распространяют мухи и грызуны. Острый период продолжается 3-9 дней – 2 недели. Острая форма – это внезапное повышение температуры до 41 градуса и больше, аппетит сохраняется. На коже возникают розово-красные точечные

образования, которые не исчезают при надавливаниях.

На 7-12 дней больные погибают или начинается в подострое/хроническое течение. Это может длиться месяцами.

Рожа

Рожа является острой, подострой/хронически протекающей болезнью. Возбудителем является рожистая бактерия, которая постоянно обитает в почве. Они имеет патогенные свойства для птиц, ягнят, человека. Но больше всего болеют свиньи 3-12 месяцев. Источник заражения – переболевшие или больные особи, их кожа, мясо, выделения, а также грызуны. Заболевание может быть зарегистрировано в любой сезон, но летом чаще.

Инкубационный период – до 8 дней. Болезнь проявляет себя резким повышением температуры – 42-42,5 градуса. Если форма сверхострая, то возможна гибель в первые несколько часов.

Обычно встречается острое течение, при нем на 2-3 день на коже появляются разные пятна, они исчезают при надавливании. Свиньи не едят, лежат на подстилке. Отмечается запор, понос, жажда. Если болезнь не лечить, то гибель наступает на 2-4 день.

Болезнь Ауэски

Среди инфекционных болезней свиней также отмечается и эта. Она вызывается фильтрующим вирусом, может поражать особей любого возраста. Заражение происходит при поедании корма, зараженного выделениями больных особей, трупами грызунов.

Переносчики – мышевидные грызуны, кошки, бродячие собаки, дикие животные, кошки. Заболевание проявляется поражениями ЦНС и судорогами мышечных групп, параличами и парезами конечностей, зудом, плавательными движениями костей. Между отдельными припадками могут встать или поесть. Взрослые свиньи переносят болезнь легко, обычно выздоравливают. У маток могут быть аборты.